


# As Laranjeiras

*José Carlos Thinôs - Eng. Agrônomo - DRAPÁLG*

Existem outras variedades do grupo Navel já instaladas no nosso país, tidas por mais tardias que a Lane Late, característica nem sempre confirmada no terreno, sendo todas variedades protegidas, também de origem australiana. Nesse lote, incluem-se a Rohde®, a Bamfeld®, a Powell® e a Chislett®

## Rohde®

Resultante da mutação espontânea de um gomo de uma laranjeira do grupo Navel, descoberta em 1932, na Austrália, por Len Robde, introduzida no Algarve no final da década de noventa. Maturação tardia, podendo manter-se na árvore até maio., sem perda de qualidade.



**Fruto:** tamanho semelhante ao da Washington Navel, com forma arredondada, com zona apical, arredondada, com umbigo de tamanho variável.

**Arvore:** vigorosa, bastante produtiva, com bom desenvolvimento e tendência para crescimento aberto, com forma arredondada similar à Washington Navel.

## Barnfeld®

Obtida por mutação da Washington Navel, descoberta na Austrália, por Wayne Bamfield, em 1985, também introduzida no Algarve no final da década de noventa. Maturação tardia, podendo manter-se na árvore até maio., sem perda de qualidade.




**Fruto:** tamanho similar ao da Washington Navel, cor de laranja, com umbigo de tamanho variável.

**Arvore:** vigorosa, bastante produtiva, com bom desenvolvimento e tendência para crescimento aberto, com forma arredondada similar à Washington Navel.

## Powell®

Obtida por mutação da Washington Navel, descoberta na Austrália, por Neily Joice, em 1932. Maturação tardia podendo colher-se de fevereiro até maio em boas condições.



**Fruto:** forma semelhante ao da Washington Navel, embora de maior tamanho, maior aderência ao pedúnculo e maior firmeza.

**Árvore:** vigorosa, bastante produtiva, com bom desenvolvimento e tendência para crescimento aberto, com forma arredondada similar à Washington Navel.

## Chislett®

Obtida por mutação da Washington Navel, descoberta na Austrália, por Norm e Greg Chislett, em 1988. Maturação tardia, podendo manter-se na árvore até maio, sem perda de qualidade.



**Fruto:** tamanho similar ao Washington Navel, forma ligeiramente achatada ou arredondada na zona peduncular e achatada na zona estilar, com umbigo de tamanho variável, pele lisa, cor de laranja-claro.

**Árvore:** vigorosa, de bom desenvolvimento com hábitos de crescimento aberto e forma arredondada, similar à Washington Navel.